香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUTCHMED (China) Limited
和黃醫藥（中國）有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：13）

自願性公告

和黃醫藥宣佈沃瑞沙® (ORPATHYS®) 聯合奧希替尼 (Osimertinib) 用於一線治療伴有MET過表達的EGFR突變肺癌患者的中國新藥上市申請獲受理

— 標誌著這一全口服聯合療法拓展至一線治療邁出的關鍵一步 —

— 基於SANOVO III期研究的數據支持：中位PFS達24.9個月，降低疾病進展或死亡風險達44%，同時展現出令人鼓舞的總生存期獲益 —

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「HUTCHMED」）今日宣佈沃瑞沙®（ORPATHYS®，賽沃替尼/savolitinib）聯合奧希替尼（osimertinib）用於治療未經治療的表皮生長因子受體（「EGFR」）敏感突變伴MET過表達的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者的新藥上市申請已獲中國國家藥品監督管理局（國家藥監局）受理。

SANOVO研究的數據支持了此項新藥上市申請。SANOVO研究是一項在伴有EGFR突變及MET過表達的既往未經過治療的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者中開展的盲法、隨機對照的中國III期臨床試驗。其研究結果已於2026年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會公佈（摘要編號：LBA69）。[1] 在意向治療人群中，沃瑞沙®和奧希替尼的聯合療法組的中位無進展生存期（「PFS」）為24.9個月，而奧希替尼單藥組則為13.8個月（風險比[「HR」]0.56；95%置信區間[「CI」]0.43-0.74；p<0.0001）。該聯合療法亦顯示出具有臨床意義的總生存期（「OS」）獲益（HR 0.48；95% CI 0.33-0.68），將中位OS延長了9.6個月（44.5個月對比34.9個月）。聯合療法的安全性特徵可控且與已知的各藥物的安全性保持一致，且沒有發現新的安全性問題。

和黃醫藥代理首席執行官兼首席財務官鄭澤鋒先生表示：「此次新藥上市申請獲受理，標誌著我們邁出關鍵一步，讓患者在治療初期就能受惠於同時阻斷EGFR和MET靶點帶來的臨床獲益。SANOVO研究凸顯了在一線治療中及時干預同時存在的MET改變的關鍵作用，結果顯示在前線治療中同時靶向這兩條通路，為無進展生存期和總生存期都帶來具有意義的改善。我們期待攜手阿斯利康，盡早將這一潛在的創新全口服、雙靶聯合療法帶給中國患者。」

在中國，基於SACHI III期研究的結果，沃瑞沙®和奧希替尼的聯合療法已獲批用於治療EGFR基因突變陽性經EGFR酪氨酸激酶抑制劑（「TKI」）治療後進展的伴MET擴增的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌患者。此次基於SANOVO研究提交的新藥上市申請，則旨在擴展該聯合療法在一線EGFR突變伴MET過表達患者中的應用。

此外，基於SAFFRON全球III期研究的積極結果，該聯合療法用於治療既往接受過EGFR-TKI治療的患者的監管註冊進程亦於美國、歐洲和日本有序推進中。其結果已於2026年ESMO年會的主席論壇（Presidential Symposium）環節公佈，並同步發表於《新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）》。

沃瑞沙®是一種強效、高選擇性的口服MET TKI，由阿斯利康與和黃醫藥共同開發，並由阿斯利康商業化。泰瑞沙®（TAGRISSO®，奧希替尼）是由阿斯利康所開發的一種不可逆的第三代EGFR-TKI。

關於非小細胞肺癌和MET異常

肺癌是全球癌症死亡的主要原因，約佔所有癌症死亡人數的五分之一（19%）。[2,3]據估計，全球每年新增肺癌病例約264萬例，其中中國約佔66萬例。[2,4] 肺癌通常分為非小細胞肺癌和小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌約佔所有肺癌患者的80-85%。[5] 大部分（約75%）非小細胞肺癌患者在確診時已是晚期。[6] 此外，美國和歐洲的非小細胞肺癌患者中約有10-15%存在EGFR突變，而亞洲患者中該比例則高達30-40%。[7]

MET是一種受體酪氨酸激酶，在細胞的正常發育過程中發揮重要作用。[8] MET過表達或擴增可導致腫瘤生長以及癌細胞的轉移進展。[8, 9]

關於SANOVO研究

SANOVO研究是一項在伴有EGFR激活突變及MET過表達的既往未經過治療的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者中開展的盲法、隨機對照的中國III期臨床試驗。該研究將評估沃瑞沙®和泰瑞沙®聯合療法對比泰瑞沙®單藥（當前此類患者的標準療法）的療效及安全性。研究共納入326例初治的伴有EGFR突變（外顯子19缺失或L858R）和MET過表達的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。患者按 1:1 的比例隨機分組，分別接受泰瑞沙®80毫克每日一次聯合沃瑞沙®或安慰劑300/200毫克每日兩次（劑量根據體重而定）。

研究的主要終點是研究者評估的PFS。其他終點包括獨立審查委員會評估的PFS、OS、客觀緩解率（ORR）、緩解持續時間（DoR）、疾病控制率（DCR）、到達疾病緩解的時間（TTR）及安全性。

關於沃瑞沙®

沃瑞沙®（賽沃替尼）是一種強效、高選擇性的口服MET TKI，在晚期實體瘤中表現出臨床活性。沃瑞沙®可阻斷MET基因突變（例如外顯子14跳變或其他點突變）、基因擴增或蛋白質過表達而導致的MET受體酪氨酸激酶信號通路的異常激活。

沃瑞沙®已於中國獲批用於治療攜帶MET外顯子14 跳變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者，是中國首個獲批的選擇性MET抑制劑。沃瑞沙®亦已於中國獲附條件批准用於治療經過至少2種系統治療後失敗的MET基因擴增的局部晚期或轉移性胃癌或胃食道連接部腺癌成人患者。基於SACHI III期研究的結果，沃瑞沙®聯合泰瑞沙®已於中國獲批用於治療EGFR基因突變陽性經EGFR-TKI治療後進展的伴MET擴增的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌患者。基於SAVANNAH全球II期研究的結果，該聯合療法亦於瑞士獲得臨時授權，用於治療經泰瑞沙®治療後疾病進展的伴有高水平MET過表達或擴增的EGFR突變局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。2026 年 8 月，一項在相同患者人群中開展的該聯合療法對比鉑類雙藥化療的SAFFRON全球III期隨機研究公佈積極的頂線結果，顯示出統計學顯著和具有臨床意義的PFS和OS改善。

關於泰瑞沙®

泰瑞沙®（奧希替尼）是一種不可逆的第三代EGFR-TKI，在治療非小細胞肺癌（包括伴中樞神經系統轉移）患者中有確證的臨床活性。

泰瑞沙®作為單藥療法已在包括美國、歐盟、中國和日本在內的120多個國家獲批。獲批適應症包括：一線治療EGFR突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌、EGFR T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌、EGFR突變的早期非小細胞肺癌的輔助治療，以及鉑類放化療後不可切除的局部晚期非小細胞肺癌。 泰瑞沙®和化療的聯合療法已在包括美國、歐盟、中國和日本在內的80多個國家獲批用於一線治療EGFR 突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的候選藥物帶向全球患者，首五個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦於美國、歐洲和日本等全球各地獲批。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com或關注我們的LinkedIn專頁。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對沃瑞沙®的治療潛力的預期，沃瑞沙®的進一步臨床研究計劃，對沃瑞沙®的研究是否能達到其主要或次要終點的預期，以及對此類研究完成時間和結果發佈的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性；臨床方案或監管要求變更；非預期不良事件或安全性問題；沃瑞沙®（包括作為聯合療法）達到研究的主要或次要終點的療效；獲得不同司法管轄區的監管批准及獲得監管批准後獲得上市許可；沃瑞沙®用於目標適應症的潛在市場；資金充足性；和黃醫藥及阿斯利康成功開發和商業化沃瑞沙®的能力。此外，由於部分研究可能依賴於其他藥物（例如奧希替尼）和沃瑞沙®聯合使用，因此此類風險和不確定性包括有關這些治療藥物的安全性、療效、供應和持續獲得監管批准的假設。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、香港聯合交易所有限公司以及AIM提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含訊息的義務。

醫療信息

本公告所提到的產品可能並未在所有國家上市，或可能以不同的商標進行銷售，或用於不同的病症，或採用不同的劑量，或擁有不同的效力。本文中所包含的任何信息都不應被看作是任何處方藥的推銷、推廣或廣告，包括那些正在研發的藥物。

---

1 Wu YL, *et al*. Savolitinib or Placebo Combined with Osimertinib in Treatment-Naïve Advanced NSCLC with EGFR Mutation and MET Overexpression: Results from the Phase 3 SANOVO Study. Presented at the European Society for Medical Oncology Congress 2026, 26 October at 08:30 CET.

2 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Lung Fact Sheet. Available at: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/15-trachea-bronchus-and-lung-fact-sheet.pdf. Accessed November 2026.

3 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. All Cancers Fact Sheet. Available at: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/39-all-cancers-fact-sheet.pdf. Accessed November 2026.

4 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. China Fact Sheet. Available at: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/160-china-fact-sheet.pdf. Accessed November 2026.

5 American Cancer Society. What Is Lung Cancer? Available at: https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/about/what-is.html. Accessed August 2026.

6 Chen HJ, *et al.* Long-term survival of advanced lung adenocarcinoma by maintenance chemotherapy followed by EGFR-TKI. *Medicine*. 2021;100(6):e24688.

7 Gao X, *et al*. The safety and efficacy of osimertinib for the treatment of EGFR T790M mutation positive non-small-cell lung cancer. *Expert Rev Anticancer Ther*. 2016;16(4):383-390.

8 Uchikawa E, *et al*. Structural basis of the activation of c-MET receptor. *Nat Commun*. 2021;12(4074)

9 Wang Q, *et al*. MET inhibitors for targeted therapy of EGFR TKI-resistant lung cancer. *J Hematol Oncol*. 2019;63.

承董事會命

非執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2026年11月26日

於本公告日期，本公司之董事為：

主席兼非執行董事：
艾樂德博士

執行董事：
蘇慰國博士
（首席執行官兼首席科學官）
鄭澤鋒先生
（代理首席執行官兼首席財務官）

非執行董事：
施熙德女士
楊凌女士

獨立非執行董事：
言思雅醫生
（高級兼首席獨立非執行董事）
胡朝紅博士
陳邵文教授
黃德偉先生